

Relazione redatta nell'ambito del progetto Leader +, realizzato con il contributo dell'Unione europea, "**La peonia e il suo territorio**".

E' vietata ogni riproduzione non autorizzata di questo testo.

Commune de Perloz

Région autonome Vallée d'Aoste

La pivoine et son territoire.

## RAPPORT SUR LA FAUNE

Maurizio Broglio

### INTRODUCTION

Cette étude, qui s'insère dans le cadre plus vaste de la recherche « La pivoine et son territoire », vise à définir un ensemble de connaissances relatives aux espèces d'oiseaux présentes sur le territoire en question, à partir tant de données publiées (bibliographie) que de reconnaissances sur le terrain.

L'espace concerné étant relativement restreint, il n'existe pas de bibliographie spécifique y afférente. Les renseignements les plus détaillés que nous possédions figurent sur la carte topographique IGM 42 I NW, qui couvre toute la zone visée par l'étude. Nous ne disposons donc pas d'indications certaines quant à la présence de diverses espèces dans cette zone, mais seulement de données laissant à supposer que la chose serait possible.

### ZONE D'ETUDE

La zone prise en considération comprend le vallon situé à l'ouest des hameaux de Fey Dessous et Fey Dessus que limite, à l'ouest, la crête où se trouve le col Fenêtre (1673 m), au sud, la crête Croix Corma (1968 m) – Mont d'Arpille et, au nord, la crête qui descend du mont Fenêtre (2056 m). L'altitude la plus faible est de 1070 m et correspond au début du sentier qui s'aventure dans le vallon et mène à Pessé. L'ensemble du territoire étudié relève de la commune de Perloz.

Voici les différents milieux que l'on peut y rencontrer :

- **Bois de feuillus en mélange** – dans la partie la plus à l'est et la plus basse de la zone, entre les hameaux de Fey et de Pessé.
- **Bois de hêtres** – dans la partie nord de la zone, au nord du sentier reliant Pessé, Fenêtre, Tchaehc et le col Fenêtre.
- **Bois de mélèzes** – dans la partie la plus au sud de la zone, sur les pentes de la Croix Corma.
- **Prairies de fauche** – aux alentours de Pessé
- **Pâturages** – essentiellement les terrains arides aux alentours de Fenêtre et de Tchaehc.

### MATERIAUX et METHODES

Reconnaissances sur le terrain – Cinq reconnaissances sur le terrain ont été effectuées durant le printemps et l'été 2006, les jours suivants : 17 mai, 30 mai, 15 juin, 30 juin et 11 juillet. Chaque fois, tous les milieux susmentionnés ont été visités et il a été pris note des différentes espèces d'oiseaux observées ou entendues pendant la reconnaissance, ainsi que du milieu ambiant et de l'altitude afférents à chaque observation.

Recherche bibliographique – Les seuls textes présentant des données classées selon une cartographie suffisamment précise pour que les espèces puissent être attribuées à la carte IGM couvrant la zone étudiée sont :

- T. Mingozi, G. Boano, C. Pulcher e coll. – **Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta 1980 – 1984**. Monographie VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1988.
- M. Cucco, L. Levi, G. Maffei, C. Pulcher – **Atlante degli uccelli del Piemonte e Valle d'Aosta in inverno 1986 – 1992**. Monographie XIX Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1996.

D'autres textes – comme celui de M. Bocca et G. Maffei, **Gli uccelli della Valle d'Aosta**, texte mis à jour et réédité en 1997 – se sont avérés inutilisables dans le cadre de cette recherche parce que dépourvus d'une cartographie suffisamment précise.

## RESULTATS et CONCLUSIONS

Les résultats des observations effectuées lors des reconnaissances sur le terrain sont présentés sous forme de tableau (**Tableau A – Reconnaissances sur le terrain**). Ledit tableau présente toutes les espèces listées par ordre systématique. Pour chaque espèce recensée, différentes données ont été enregistrées : la date de l'observation, les altitudes minimales et maximales d'observation, le type d'environnement où ladite espèce a été observée et quelques commentaires, le cas échéant.

Les résultats de la recherche bibliographique figurent dans les tableaux suivants (**Tableau B – Oiseaux nidificateurs**, **Tableau C – Oiseaux hivernants**). Ces données se réfèrent à la carte IGM 42 I NW, qui couvre toute la zone étudiée, mais qui comprend également d'autres milieux que ceux qui ont été pris en considération : certaines parties du cours du Lys et de la Doire Baltée, différentes portions de la plaine, en fond de vallée, et enfin de hautes montagnes. Il a donc été nécessaire de procéder à une sélection et d'éliminer de la liste des espèces susceptibles de se trouver dans la zone toutes celles qui vivent dans des milieux naturels incompatibles avec le contexte étudié (telles que le héron cendré, *Ardea cinerea*, par exemple).

Les reconnaissances sur le terrain ont permis de repérer 35 espèces. Compte tenu des données dont nous disposons, il est difficile de dire s'il s'agit d'oiseaux habitués à nidifier dans cette zone, sauf en ce qui concerne les espèces dont nous avons entendu le chant lors de chacune de nos reconnaissances : le pinson des arbres (*Fringilla coelebs*), la fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) la mésange boréale (*Parus montanus*) et la mésange noire (*Parus ater*) dont un nid habité a été trouvé à 1530 m d'altitude, dans un mur en pierres sèches non loin du chalet de Tchaehc.

Cinq des espèces observées dans cette zone figurent sur la « liste rouge » des oiseaux d'Italie. Deux d'entre elles sont classées « VU-vulnérable » ; l'aigle royal (*Aquila chrysaetos*) et la perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*). Trois autres sont dans la catégorie LR-faible risque : le tétras-lyre (*Tetrao tetrix*), le pivert (*Picus viridis*) et le grand corbeau (*Corvus corax*). Même si la faune ornithologique ne représente pas le principal intérêt naturel de cette zone, il convient toutefois de souligner que cette dernière en est relativement riche et compte même quelques espèces tout à fait remarquables.

Le long du sentier qui va de Pessé à Fey, à 1200 m d'altitude, l'on a trouvé au pied d'une petite paroi rocheuse, une pelote de réjection, probablement due à une chouette hulotte (*Strix aluco*).

Signalons, en sus de tous ces oiseaux qui font l'objet de l'étude, la présence de deux mammifères observés durant nos reconnaissances sur le terrain : le chamois (*Rupicapra rupicapra*) – aperçu le 30 mai dans un bois de mélèzes sur les pentes de la Croix Corma à environ 1700 m d'altitude – et le chevreuil (*Capreolus capreolus*) aperçu ou entendu à plusieurs reprises : le 17 mai, dans un bois de mélèzes un animal a été entendu à environ 1500 m d'altitude ; le 30 mai, légèrement en amont de Pessé, un mâle et une femelle ont été observés et entendus ; enfin, le 15 juin un peu en amont de Pessé, un mâle a de nouveau été observé dans le bois de mélèzes, à environ 1750 m d'altitude.

**TABLEAU A – RECONNAISSANCES SUR LE TERRAIN**

ESPECE	DATE	ALTITUDE MINIMUM OU ALTITUDE HABITUELLE	ALTITUDE MAXIMUM	LIEU	NOTES
Aigle royal ( <i>Aquila chrysaetos</i> )	17/05/2006	1800	2000	crête entre le col et le mont Fenêtre	un individu adulte en vol
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	15/06/2006	1800		sur la zone	en vol
	30/06/2006	1750		sur la zone	en vol
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	30/06/2006	1700		sur la zone	en vol le long des parois rocheuses au Nord du col Fenêtre
Tétras-lyre ( <i>Tetrao tetrix</i> )	17/05/2006	1600	1800	forêt de mélèzes, pentes de la Croix Corma	mâles, roucoulement grave
	30/05/2006	1750		forêt de mélèzes, pentes de la Croix Corma	envol d'une femelle
	15/06/2006	1930		rares mélèzes et sous-bois dense (rhododendrons), sommet de la Croix Corma	envol d'une femelle
	30/06/2006	1720		forêt de mélèzes, pentes de la Croix Corma	envol d'une femelle
Perdrix bartavelle ( <i>Alectoris graeca</i> )	17/05/2006	1480		pâturages arides en amont de Fenêtre	envol de trois individus
Coucou gris ( <i>Cuculus canorus</i> )	17/05/2006	1070	1850	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1400	1750	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	15/06/2006	1070	1850	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1450	1670	hêtraie, forêt de mélèzes	
Pivert ( <i>Picus viridis</i> )	17/05/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	15/06/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	11/07/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
Pic noir ( <i>Dryocopus martius</i> )	30/06/2006	1530		hêtraie	
	11/07/2006	1650		forêt de mélèzes	
Pic épeiche ( <i>Picoides major</i> )	15/06/2006	1180		bois essentiellement constitué de feuillus	
	11/07/2006	1250		bois essentiellement constitué de feuillus	
Hirondelle de fenêtre ( <i>Delichon urbica</i> )	11/07/2006	1450		près de la paroi rocheuse au Nord-Ouest de Fenêtre	individus en vol
Pipit des arbres ( <i>Anthus trivialis</i> )	30/05/2006	1320		prairies de fauche ombragées en amont de Pessé	
	15/06/2006	1550	1950	forêt de mélèzes, pâturages et pierraille avec quelques mélèzes au sommet de la Croix Corma	
	30/06/2006	1930		pâturages et pierraille avec quelques mélèzes au sommet de la Croix Corma	
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	15/06/2006	1300		hameau de Pessé	
	11/07/2006	1300		hameau de Pessé	

Pie-grièche écorcheur ( <i>Lanius collurio</i> )	15/06/2006	1480		prairie aride et buissons en amont de Fenêtre	
Geai des chênes ( <i>Garrulus glandarius</i> )	17/05/2006	1300	1580	Pessé, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1460		pâturages ombragés en amont de Fenêtre	
	15/06/2006	1320		prairies de fauche ombragées en amont de Pessé	
	30/06/2006	1450		pâturages ombragés en amont de Fenêtre	
	11/07/2006	1100	1440	bois essentiellement constitué de feuillus, pâturages ombragés aux alentours de Fenêtre	
Cassenox moucheté ( <i>Nucifraga caryocatactes</i> )	17/05/2006	1350	1670	forêt mixte de mélèzes et de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1600		forêt de mélèzes	
	15/06/2006	1500	1850	forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1650	1820	forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1400	1670	forêt de mélèzes	
Grand corbeau ( <i>Corvus corax</i> )	17/05/2006	1800		sur la crête aux alentours du col Fenêtre	en vol
	15/06/2006	1600		sur la zone	en vol
	30/06/2006	1160		sur la zone	en vol

Troglodyte mignon ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	15/06/2006	1600	1700	forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1100	1820	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1150	1400	bois essentiellement constitué de feuillus	
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	17/05/2006	1300		prairies de fauche ombragées aux alentours de Pessé	
	30/05/2006	1350	1600	prairies de fauche ombragées aux alentours de Pessé et du col Fenêtre	
	15/06/2006	1120	1700	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1100	1650	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1070	1620	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
Pouillot véloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	17/05/2006	1350	1550	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1300	1600	prairies de fauche ombragées aux alentours de Pessé, forêt de mélèzes	
	15/06/2006	1120	1400	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1300	1650	forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1520	1600	forêt de mélèzes	
Pouillot de Bonelli ( <i>Phylloscopus bonellii</i> )	17/05/2006	1200	1300	bois essentiellement constitué de feuillus, prairies de fauche aux alentours de Pessé	
Rougequeue noir ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	30/05/2006	1300	1537	Pessé, Tchaehc	
	15/06/2006	1537		Tchaehc	
	30/06/2006	1300	1537	Hameaux de Pessé et de Tchaehc	
	11/07/2006	1537		chalet de Tchaehc	
Rouge-gorge ( <i>Erithacus rubecula</i> )	17/05/2006	1600		forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1070	1400	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	15/06/2006	1070	1500	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1070	1800	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1150	1620	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	15/06/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1070	1450	bois essentiellement constitué de feuillus	
	11/07/2006	1300	1440	à Pessé, à Fenêtre	
Merle ( <i>Turdus merula</i> )	17/05/2006	1200		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/05/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	15/06/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1070	1450	bois essentiellement constitué de feuillus	
	11/07/2006	1300	1440	à Pessé, à Fenêtre	
Grive draine ( <i>Turdus viscivorus</i> )	17/05/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/05/2006	1530		pâturages aux alentours de Tchaehc	
	15/06/2006	1300		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1250		bois essentiellement constitué de feuillus	
Mésange à longue queue ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	15/06/2006	1350		prairies de fauche ombragées en amont de Pessé	
Mésange boréale ( <i>Parus montanus</i> )	17/05/2006	1580		forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1500	1600	forêt de mélèzes	
	15/06/2006	1350	1700	prairies de fauche ombragées en amont de Pessé, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1740	1860	forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1650		forêt de mélèzes	
Mésange nonnette ( <i>Parus palustris</i> )	15/06/2006	1120		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1150		bois essentiellement constitué de feuillus	
Mésange noire ( <i>Parus ater</i> )	17/05/2006	1200	1300	bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/05/2006	1200	1530	bois essentiellement constitué de feuillus aux alentours de Tchaehc	à 1530 m aux alentours du chalet de Tchaehc, nid dans un mur en pierres sèches
	15/06/2006	1200	1700	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes, hêtraie	
	30/06/2006	1360	1720	forêt de mélèzes	
	11/07/2006	1400	1620	forêt de mélèzes, hêtraie	
Mésange bleue ( <i>Parus caeruleus</i> )	15/06/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1360		prairies de fauche ombragées en amont de Pessé	

Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> )	17/05/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/05/2006	1440		hêtraie	
	15/06/2006	1070		bois essentiellement constitué de feuillus	
	30/06/2006	1300	1450	prairies de fauche ombragées aux alentours de Pessé, arbres clairsemés aux alentours de Fenêtré	
Sittelle torchepot ( <i>Sitta europaea</i> )	15/06/2006	1200		bois essentiellement constitué de feuillus	
	11/07/2006	1220		bois essentiellement constitué de feuillus	
Grimpereau des bois ( <i>Certhia familiaris</i> )	30/05/2006	1750		forêt de mélèzes	
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	17/05/2006	1070	1750	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1070	1850	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes, hêtraie	
	15/06/2006	1070	1950	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
	30/06/2006	1160	1900	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes, hêtraie	
	11/07/2006	1070	1650	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
Bouvreuil pivoine ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	17/05/2006	1500		forêt de mélèzes	
	30/05/2006	1070	1600	bois essentiellement constitué de feuillus, forêt de mélèzes	
Bruant fou ( <i>Emberiza cia</i> )	17/05/2006	1350		prairies de fauche ombragées en amont de Pessé	
	15/06/2006	1300		bois essentiellement constitué de feuillus	

### **TABLEAU B - OISEAUX NIDIFICATEURS**

Espèces potentiellement présentes dans la zone étudiée  
et sélectionnées, parmi celles que la carte topographique IGM 42 I NW signale comme présentes,  
dans T. Mingozi, G. Boano, C. Pulcher e coll. –  
*Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte et Valle d'Aosta 1980 – 1984.*  
Monographie VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1988.

<b>Espèces</b>	<b>Nidification</b>
Bondrée apivore ( <i>Pernis apivorus</i> )	possible
Milan noir ( <i>Milvus migrans</i> )	possible
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	probable
Aigle royal ( <i>Aquila chrysaetos</i> )	possible
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	probable
Tétras-lyre ( <i>Tetrao tetrix</i> )	certaine
Perdrix bartavelle ( <i>Alectoris graeca</i> )	certaine
Tourterelle des bois ( <i>Streptopelia turtur</i> )	possible
Coucou gris ( <i>Cuculus canorus</i> )	probable
Chevêche d'Athéna ( <i>Athene noctua</i> )	possible
Chouette hulotte ( <i>Strix aluco</i> )	possible
Martinet noir d'Europe ( <i>Apus apus</i> )	certaine
Huppe fasciée ( <i>Upupa epops</i> )	possible
Torcol fourmilier ( <i>Jynx torquilla</i> )	probable
Pivert ( <i>Picus viridis</i> )	certaine
Pic épeiche ( <i>Picoides major</i> )	certaine
Hirondelle de rochers ( <i>Ptyonoprogne rupestris</i> )	probable

Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )	certaine
Hirondelle de fenêtre ( <i>Delichon urbica</i> )	certaine
Pipit des arbres ( <i>Anthus trivialis</i> )	probable
Bergeronnette des ruisseaux ( <i>Motacilla cinerea</i> )	certaine
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	certaine
Troglodyte mignon ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	probable
Accenteur mouchet ( <i>Prunella modularis</i> )	probable
Rouge-gorge ( <i>Erithacus rubecula</i> )	probable
Rossignol philomèle ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	probable
Rougequeue noir ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	probable
Tarier pâtre ( <i>Saxicola torquata</i> )	possible
Monticole bleu ( <i>Monticola solitarius</i> )	certaine
Merle ( <i>Turdus merula</i> )	certaine
Hypolaïs polyglotte ( <i>Hippolais polyglotta</i> )	probable
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	probable
Pouillot de Bonelli ( <i>Phylloscopus bonelli</i> )	probable
Pouillot véloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	probable
Mésange à longue queue ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	probable
Mésange nonnette ( <i>Parus palustris</i> )	probable
Mésange noire ( <i>Parus ater</i> )	probable
Mésange bleue ( <i>Parus caeruleus</i> )	probable
Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> )	certaine
Sittelle torchepot ( <i>Sitta europaea</i> )	certaine
Pie-grièche écorcheur ( <i>Lanius collurio</i> )	certaine
Geai des chênes ( <i>Garrulus glandarius</i> )	certaine
Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> )	probable
Corneille noire ( <i>Corvus corone corone</i> )	certaine

Corneille mantelée ( <i>Corvus corone cornix</i> )	possible
Grand corbeau ( <i>Corvus corax</i> )	certaine
Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	certaine
Moineau cisalpin ( <i>Passer domesticus italiae</i> )	certaine
Moineau friquet ( <i>Passer montanus</i> )	certaine
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	probable
Serin cini ( <i>Serinus serinus</i> )	probable
Verdier d'Europe ( <i>Carduelis chloris</i> )	probable
Chardonneret élégant ( <i>Carduelis carduelis</i> )	probable
Grosbec casse-noyaux ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	probable
Bruant zizi ( <i>Emberiza cirlus</i> )	probable
Bruant fou ( <i>Emberiza cia</i> )	probable
Bruant proyer ( <i>Miliaria calandra</i> )	probable



### TABLEAU C – OISEAUX HIVERNANTS

Espèces potentiellement présentes dans la zone de l'étude, sélectionnées parmi celles indiquées comme présentes par la carte IGM 42 I NW dans l'ouvrage de M. Cucco, L. Levi, G. Maffei et C. Pulcher *Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta in inverno 1986 – 1992. Monografia XIX – Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1996.*

Astore ( <i>Accipiter gentilis</i> )	Autour des palombes
Sparviere ( <i>Accipiter nisus</i> )	Épervier d'Europe
Poiana ( <i>Buteo buteo</i> )	Buse
Aquila reale ( <i>Aquila chrysaetos</i> )	Aigle royal
Gheppio ( <i>Falco tinnunculus</i> )	Faucon crécerelle
Coturnice ( <i>Alectoris graeca</i> )	Perdrix bartavelle
Gabbiano comune ( <i>Larus ridibundus</i> )	Mouette rieuse
Picchio verde ( <i>Picus viridis</i> )	Pivert
Picchio rosso maggiore ( <i>Picoides major</i> )	Pic épeiche
Ballerina gialla ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Bergeronnette des ruisseaux
Scricciolo ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Troglodyte mignon
Passera scopaiola ( <i>Prunella modularis</i> )	Accenteur mouchet
Sordone ( <i>Prunella collaris</i> )	Accenteur alpin
Pettiorosso ( <i>Eritacus rubecula</i> )	Rouge-gorge
Merlo ( <i>Turdus merula</i> )	Merle
Cesena ( <i>Turdus pilaris</i> )	Grive litorne
Regolo ( <i>Regulus regulus</i> )	Roitelet huppé
Codibugnolo ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	Mésange à longue queue
Cincia bigia ( <i>Parus palustris</i> )	Mésange nonnette
Cincia bigia alpestre ( <i>Parus montanus</i> )	Mésange boréale
Cincia dal ciuffo ( <i>Parus cristatus</i> )	Mésange huppée
Cincia mora ( <i>Parus ater</i> )	Mésange noire
Cinciarella ( <i>Parus caeruleus</i> )	Mésange bleue
Cinciallegra ( <i>Parus major</i> )	Mésange charbonnière
Picchio muratore ( <i>Sitta europaea</i> )	Sittelle torchepot
Rampichino ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	Grimpereau des jardins
Ghiandaia ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Geai
Nocciolaia ( <i>Nucifraga caryocatactes</i> )	Cassenoix moucheté
Gracchio alpino ( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )	Chocard des Alpes
Corvo ( <i>Corvus frugileus</i> )	Corbeau
Cornacchia nera ( <i>Corvus corone corone</i> )	Corneille noire
Cornacchia grigia ( <i>Corvus corone cornix</i> )	Corneille mantelée
Corvo imperiale ( <i>Corvus corax</i> )	Grand corbeau
Storno ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Etourneau d'Europe
Passera d'Italia ( <i>Passer italiae</i> )	Moineau cisalpin
Passera mattugia ( <i>Passer montanus</i> )	Moineau friquet
Fringuello ( <i>Fringilla coelebs</i> )	Pinson des arbres
Venturone ( <i>Serinus citrinella</i> )	Venturon montagnard
Cardellino ( <i>Carduelis carduelis</i> )	Chardonneret élégant
Lucarino ( <i>Carduelis spinus</i> )	Tarin des aulnes
Organetto ( <i>Carduelis flammea</i> )	Sizerin flammé
Crociere ( <i>Loxia curvirostra</i> )	Bec-croisé des sapins
Ciuffolotto ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	Bouvreuil pivoine
Frosone ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	Grosbec casse-noyaux
Zigolo muciatto ( <i>Emberiza cia</i> )	Bruant fou