

Relazione redatta nell'ambito del progetto Leader +, realizzato con il contributo dell'Unione europea, "**La peonia e il suo territorio**".

E' vietata ogni riproduzione non autorizzata di questo testo.

Comune di Perloz.

Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La peonia e il suo territorio.

RELAZIONE FAUNISTICA

Maurizio Broglio

INTRODUZIONE

Nell'ambito della più ampia ricerca denominata "La peonia e il suo territorio", il presente studio ha per scopo la formazione di un quadro di conoscenze riguardanti la presenza di specie di uccelli sul territorio preso in esame, sia tramite l'analisi di dati bibliografici pubblicati in letteratura, sia tramite uscite sul campo.

Essendo l'area di studio piuttosto limitata non esistono dati bibliografici relativi specificamente a detta area. Le informazioni maggiormente dettagliate si riferiscono alla tavoletta IGM 42 I NW, all'interno della quale si trova l'intera area di studio. Le indicazioni bibliografiche quindi non forniscono dati di presenza certa nell'area di studio ma di potenziale presenza.

AREA DI STUDIO

L'area presa in considerazione comprende il vallone a ovest degli abitati di Fey Dessous e Fey Dessus, delimitato a ovest dalla cresta su cui sorge il Col de Fenêtre (1673m), a sud dalla cresta della Croix Corma (1968m) – Mont d'Arpille, a nord dalla cresta che scende dal Mont de Fenêtre (2056m). La quota minima presa in considerazione sono i 1070m, quota di partenza del sentiero che conduce a Pessé e all'interno del vallone. L'intero territorio è compreso nel comune di Perloz.

Le tipologie ambientali possono essere così suddivise:

- **Bosco misto di latifoglie**; nella parte più orientale e più bassa in quota dell'area, tra gli abitati di Fey e di Pessé.
- **Faggeta**; nella parte settentrionale dell'area, a nord del sentiero che congiunge Pessé, Fenêtre, Tchaehc, Col de Fenêtre.
- **Lariceto**; nella parte più meridionale dell'area, sulle pendici della Croix Corma.
- **Prati da sfalcio**; nei dintorni di Pessé
- **Pascoli**; per lo più pascoli aridi nei dintorni di Fenêtre e Tchaehc.

MATERIALI E METODI

Uscite sul campo - sono state effettuate cinque uscite tra la primavera e l'estate del 2006 nelle seguenti date: 17/05, 30/05, 15/06, 30/06, 11/07. Durante ognuna di queste uscite sono stati toccati tutti gli ambienti citati sopra e annotate tutte le specie di uccelli osservate o sentite lungo il percorso, con indicazione del tipo di ambiente e della quota di ogni osservazione.

Ricerca bibliografica – gli unici testi con i dati ordinati secondo una cartografia sufficientemente precisa da attribuire le specie alla tavoletta IGM all'interno della quale ricade l'area in esame sono:

- T. Mingozi, G. Boano, C. Pulcher e coll. – **Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta 1980 – 1984**. Monografia VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 1988

- M. Cucco, L. Levi, G. Maffei, C. Pulcher – **Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta in inverno 1986 – 1992**. Monografia XIX Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 1996.

Altri testi, come ad esempio M. Bocca, G. Maffei – **Gli uccelli della Valle d'Aosta**, ristampa aggiornata 1997, si sono rivelati inutilizzabili ai fini di questa ricerca perché privi di una cartografia sufficientemente precisa.

RISULTATI E CONCLUSIONI

I risultati delle osservazioni compiute durante le uscite sono elencati nella tabella allegata (**Tabella A uscite sul campo**).

La tabella è ordinata per specie, e le specie sono elencate in ordine sistematico. Per ogni specie censita sono indicati la data dell'osservazione, la quota minima e la quota massima a cui la specie è stata osservata, il tipo di ambiente frequentato dalla specie al momento dell'osservazione, eventuali note.

I risultati della ricerca bibliografica sono contenuti nelle tabelle allegate (**Tabella B nidificanti, Tabella C svernanti**). I dati si riferiscono alla tavoletta IGM 42 I NW, che contiene l'intera area di studio, ma anche ambienti diversi da quello preso in esame: tratti del torrente Lys e della Dora Baltea, porzioni della piana di fondovalle, vette elevate. Questo ha reso necessario operare una scrematura eliminando dall'elenco delle specie potenzialmente presenti quelle appartenenti ad ambienti incompatibili con quello studiato (ad es. l'Airone cenerino *Ardea cinerea*).

Le uscite hanno portato all'individuazione di 35 specie presenti; difficile, con i dati disponibili, stabilire se si tratta di specie nidificanti nell'area, a parte pochi casi di specie sistematicamente udite in canto durante tutte le uscite: Fringuello (*Fringilla coelebs*), Capinera (*Sylvia atricapilla*) Cincia bigia alpestre (*Parus montanus*) e la Cincia mora (*Parus ater*) di cui è stato trovato un nido frequentato a 1530 m presso la baita di Tchaehc in un muro a secco.

Cinque specie osservate nell'area risultano incluse nella "lista rossa" degli uccelli italiani. Due di queste: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) sono classificate come VU-vulnerabili, tre: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) Picchio verde (*Picus viridis*) e Corvo imperiale (*Corvus corax*) come LR-a rischio più basso. Pur non essendo l'ornitofauna il principale elemento di interesse naturalistico dell'area va dunque sottolineata una discreta ricchezza di specie alcune delle quali di notevole pregio.

Nel tratto di sentiero tra Pessé e Fey, a 1200m è stata trovata, ai piedi di una paretina rocciosa, una borra probabilmente riconducibile ad un Allocco (*Strix aluco*).

Oltre alla presenza dell'ornitofauna, motivo di questo studio, va segnalata la presenza di due mammiferi accertata durante le uscite sul campo. Si tratta del Camoscio (*Rupicapra rupicapra*) visto il 30/05 in lariceto sulle pendici della Croix Corma a circa 1700m di quota e del Capriolo (*Capreolus capreolus*) visto e/o sentito a più riprese nelle seguenti occasioni: 17/05 in lariceto sentito un individuo a circa 1500m di quota; 30/05 poco a monte di Pessé visto e sentito un maschio e una femmina; 15/06 poco a monte di Pessé visto un maschio, lariceto a circa 1750m nuovamente visto un maschio.

Nota sulla fruibilità didattica dell'area in merito alla fauna

Per la maggior parte della fauna presente nell'area presa in esame l'avvistamento è un fatto imprevedibile. Molte delle specie osservate non risiedono stabilmente nell'area ma la frequentano o la attraversano sporadicamente. Le specie stabilmente presenti (almeno nel periodo primaverile-estivo) sono per lo più piccoli passeriformi la cui individuazione avviene più spesso al canto che non alla vista. Per queste ragioni l'area, come peraltro la maggior parte del territorio regionale, non si presta ad una fruizione didattica orientata specificamente sull'osservazione diretta della fauna.

Oltre al pannello sulla fauna, già previsto, vedo, come unica modalità per fruire degli aspetti faunistici dell'area, un'attività in un certo senso a traino delle attività escursionistiche relative alla Peonia. In altri termini, se le guide che accompagneranno gli escursionisti alla ricerca della Peonia saranno in grado di identificare alla vista o al canto le specie di uccelli più comuni nell'area

(Fringuello, Capinera, Lù piccolo, Cincia bigia alpestre, Cincia mora, Ghiandaia, Nocciolaia, Picchio verde, Picchio rosso maggiore) e le specie di mammiferi potenzialmente avvistabili (Capriolo, Camoscio, Volpe, Scoiattolo) l'escursione, pur non essendo orientata come motivo di interesse principale verso l'osservazione della fauna, potrà esserne notevolmente arricchita e completata.

TABELLA A USCITE SUL CAMPO

| SPECIE | DATA USCITA | QUOTA MINIMA O UNICA m | QUOTA MASSIMA m | AMBIENTE | NOTE |
|--|-------------|------------------------|-----------------|---|---|
| Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>) | 17/05/2006 | 1800 | 2000 | in volo, Cresta tra Col de Fenêtre e Mont de Fenêtre | un individuo adulto in volo |
| Poiana (<i>Buteo buteo</i>) | 15/06/2006 | 1800 | | in volo sull'area | |
| | 30/06/2006 | 1750 | | in volo sull'area | |
| Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>) | 30/06/2006 | 1700 | | in volo sull'area | in volo lungo le pareti di roccia a nord del Col de Fenêtre |
| Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) | 17/05/2006 | 1600 | 1800 | lariceto, pendici della Croix Corma | maschi, rugolio |
| | 30/05/2006 | 1750 | | lariceto, pendici della Croix Corma | involo di una femmina |
| | 15/06/2006 | 1930 | | larici radi con fitto sottobosco di rododendro, sommità della Croix Corma | involo di una femmina |
| | 30/06/2006 | 1720 | | lariceto, pendici della Croix Corma | involo di una femmina |
| Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) | 17/05/2006 | 1480 | | pascoli aridi a monte di Fenêtre | involo di tre individui |
| Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>) | 17/05/2006 | 1070 | 1850 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1400 | 1750 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 15/06/2006 | 1070 | 1850 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1450 | 1670 | faggeta, lariceto | |
| Picchio verde (<i>Picus viridis</i>) | 17/05/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 15/06/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 11/07/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>) | 30/06/2006 | 1530 | | faggeta | |
| | 11/07/2006 | 1650 | | lariceto | |
| Picchio rosso maggiore (<i>Picoides major</i>) | 15/06/2006 | 1180 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 11/07/2006 | 1250 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>) | 11/07/2006 | 1450 | | presso parete di roccia nord-ovest di Fenêtre | alcuni individui in volo |
| Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>) | 30/05/2006 | 1320 | | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé | |
| | 15/06/2006 | 1550 | 1950 | lariceto, pascolo e pietraia con larici radi in sommità alla Croix Corma | |
| | 30/06/2006 | 1930 | | pascolo e pietraia con larici radi in sommità alla Croix Corma | |
| Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>) | 15/06/2006 | 1300 | | villaggio di Pessé | |
| | 11/07/2006 | 1300 | | villaggio di Pessé | |
| Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>) | 15/06/2006 | 1480 | | prato arido con cespugli a monte di Fenêtre | |
| Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) | 17/05/2006 | 1300 | 1580 | Pessé, lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1460 | | pascolo alberato a monte di Fenêtre | |
| | 15/06/2006 | 1320 | | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé | |
| | 30/06/2006 | 1450 | | pascolo alberato a monte di Fenêtre | |
| | 11/07/2006 | 1100 | 1440 | bosco a prevalenza di latifoglie, pascolo alberato presso Fenêtre | |
| Nocciolaia (<i>Nucifraga caryocatactes</i>) | 17/05/2006 | 1350 | 1670 | bosco misto larice e latifoglie, lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1600 | | lariceto | |
| | 15/06/2006 | 1500 | 1850 | lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1650 | 1820 | lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1400 | 1670 | lariceto | |
| Corvo imperiale (<i>Corvus corax</i>) | 17/05/2006 | 1800 | | in volo cresta presso il Col de Fenêtre | |
| | 15/06/2006 | 1600 | | in volo sull'area | |

| | | | | | |
|---|------------|------|------|--|--|
| | 30/06/2006 | 1160 | | in volo sull'area | |
| Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>) | 15/06/2006 | 1600 | 1700 | lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1100 | 1820 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1150 | 1400 | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>) | 17/05/2006 | 1300 | | prati da sfalcio alberati presso Pessé | |
| | 30/05/2006 | 1350 | 1600 | prati da sfalcio alberati presso Pessé, presso il Col de Fenêtre | |
| | 15/06/2006 | 1120 | 1700 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1100 | 1650 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1070 | 1620 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| Lù piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>) | 17/05/2006 | 1350 | 1550 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1300 | 1600 | prati da sfalcio alberati presso Pessé, lariceto | |
| | 15/06/2006 | 1120 | 1400 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1300 | 1650 | lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1520 | 1600 | lariceto | |
| Lù bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>) | 17/05/2006 | 1200 | 1300 | bosco a prevalenza di latifoglie, prati da sfalcio presso Pessé | |
| Codiroso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>) | 30/05/2006 | 1300 | 1537 | Pessé, Tchaehc | |
| | 15/06/2006 | 1537 | | Tchaehc | |
| | 30/06/2006 | 1300 | 1537 | villaggio di Pessé, Tchaehc | |
| | 11/07/2006 | 1537 | | baite di Tchaehc | |
| Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>) | 17/05/2006 | 1600 | | lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1070 | 1400 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 15/06/2006 | 1070 | 1500 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1070 | 1800 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1150 | 1620 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto | |
| Merlo (<i>Turdus merula</i>) | 17/05/2006 | 1200 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/05/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 15/06/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/06/2006 | 1070 | 1450 | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 11/07/2006 | 1300 | 1440 | a Pessé, a Fenêtre | |
| Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>) | 17/05/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/05/2006 | 1530 | | pascolo presso Tchaehc | |
| | 15/06/2006 | 1300 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/06/2006 | 1250 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>) | 15/06/2006 | 1350 | | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé | |
| Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>) | 17/05/2006 | 1580 | | lariceto | |
| | 30/05/2006 | 1500 | 1600 | lariceto | |
| | 15/06/2006 | 1350 | 1700 | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé, lariceto | |
| | 30/06/2006 | 1740 | 1860 | lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1650 | | lariceto | |
| Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>) | 15/06/2006 | 1120 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/06/2006 | 1150 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| Cincia mora (<i>Parus ater</i>) | 17/05/2006 | 1200 | 1300 | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/05/2006 | 1200 | 1530 | bosco a prevalenza di latifoglie, presso Tchaehc | a 1530 m presso la baita di Tchaehc nido in muro a secco |
| | 15/06/2006 | 1200 | 1700 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto, faggeta | |
| | 30/06/2006 | 1360 | 1720 | lariceto | |
| | 11/07/2006 | 1400 | 1620 | lariceto, faggeta | |
| Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>) | 15/06/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie | |
| | 30/06/2006 | 1360 | | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé | |

| | | | | |
|---|------------|------|------|--|
| Cinciallegra (<i>Parus major</i>) | 17/05/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie |
| | 30/05/2006 | 1440 | | faggeta |
| | 15/06/2006 | 1070 | | bosco a prevalenza di latifoglie |
| | 30/06/2006 | 1300 | 1450 | prati da sfalcio alberati presso Pessé, alberi sparsi presso Fenêtre |
| Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>) | 15/06/2006 | 1200 | | bosco a prevalenza di latifoglie |
| | 11/07/2006 | 1220 | | bosco a prevalenza di latifoglie |
| Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>) | 30/05/2006 | 1750 | | lariceto |
| Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>) | 17/05/2006 | 1070 | 1750 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto |
| | 30/05/2006 | 1070 | 1850 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto, faggeta |
| | 15/06/2006 | 1070 | 1950 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto |
| | 30/06/2006 | 1160 | 1900 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto, faggeta |
| | 11/07/2006 | 1070 | 1650 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto |
| Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) | 17/05/2006 | 1500 | | lariceto |
| | 30/05/2006 | 1070 | 1600 | bosco a prevalenza di latifoglie, lariceto |
| Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) | 17/05/2006 | 1350 | | prati da sfalcio alberati a monte di Pessé |
| | 15/06/2006 | 1300 | | bosco a prevalenza di latifoglie |

TABELLA B NIDIFICANTI specie potenzialmente presenti nell'area di studio

selezionate da quelle indicate come presenti nella Tavolettta IGM 42 I NW in:

T. Mingozzi, G. Boano, C. Pulcher e coll. – **Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta 1980 – 1984**. Monografia VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 1988

| specie | nidificazione |
|--|----------------------|
| Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>) | possibile |
| Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>) | possibile |
| Poiana (<i>Buteo buteo</i>) | probabile |
| Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>) | possibile |
| Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>) | probabile |
| Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) | certa |
| Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) | certa |
| Tortora selvatica (<i>Streptopelia turtur</i>) | possibile |
| Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>) | probabile |
| Civetta (<i>Athene noctua</i>) | possibile |
| Allocco (<i>Strix aluco</i>) | possibile |
| Rondone comune (<i>Apus apus</i>) | certa |
| Upupa (<i>Upupa epops</i>) | possibile |
| Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>) | probabile |
| Picchio verde (<i>Picus viridis</i>) | certa |
| Picchio rosso maggiore (<i>Picoides major</i>) | certa |
| Rondine montana (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>) | probabile |
| Rondine (<i>Hirundo rustica</i>) | certa |
| Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>) | certa |
| Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>) | probabile |
| Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>) | certa |
| Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>) | certa |
| Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>) | probabile |
| Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>) | probabile |
| Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>) | probabile |
| Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>) | probabile |
| Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>) | probabile |
| Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>) | possibile |
| Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>) | certa |
| Merlo (<i>Turdus merula</i>) | certa |
| Canapino (<i>Hippolais polyglotta</i>) | probabile |
| Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>) | probabile |
| Luì bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>) | probabile |
| Luì piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>) | probabile |
| Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>) | probabile |
| Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>) | probabile |
| Cincia mora (<i>Parus ater</i>) | probabile |
| Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>) | probabile |
| Cinciallegra (<i>Parus major</i>) | certa |
| Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>) | certa |
| Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>) | certa |
| Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) | certa |
| Gazza (<i>Pica pica</i>) | probabile |
| Cornacchia nera (<i>Corvus corone corone</i>) | certa |

| | |
|---|-----------|
| Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) | possibile |
| Corvo imperiale (<i>Corvus corax</i>) | certa |
| Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) | certa |
| Passera d'Italia (<i>Passer domesticus italiae</i>) | certa |
| Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>) | certa |
| Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>) | probabile |
| Verzellino (<i>Serinus serinus</i>) | probabile |
| Verdone (<i>Carduelis chloris</i>) | probabile |
| Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>) | probabile |
| Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>) | probabile |
| Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>) | probabile |
| Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) | probabile |
| Strillozzo (<i>Miliaria calandra</i>) | probabile |

TABELLA C SVERNANTI specie potenzialmente presenti nell'area di studio

selezionate da quelle indicate come presenti nella Tavoleta IGM 42 I NW in:

M. Cucco, L. Levi, G. Maffei, C. Pulcher – **Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d'Aosta in inverno 1986 – 1992**. Monografia XIX Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 1996.

| |
|---|
| Astore (<i>Accipiter gentilis</i>) |
| Sparviere (<i>Accipiter nisus</i>) |
| Poiana (<i>Buteo buteo</i>) |
| Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>) |
| Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>) |
| Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) |
| Gabbiano comune (<i>Larus ridibundus</i>) |
| Picchio verde (<i>Picus viridis</i>) |
| Picchio rosso maggiore (<i>Picoides major</i>) |
| Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>) |
| Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>) |
| Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>) |
| Sordone (<i>Prunella collaris</i>) |
| Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>) |
| Merlo (<i>Turdus merula</i>) |
| Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) |
| Regolo (<i>Regulus regulus</i>) |
| Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>) |
| Cincia bigia (<i>Parus palustris</i>) |
| Cincia bigia alpestre (<i>Parus montanus</i>) |
| Cincia dal ciuffo (<i>Parus cristatus</i>) |
| Cincia mora (<i>Parus ater</i>) |
| Cinciarella (<i>Parus caeruleus</i>) |
| Cinciallegra (<i>Parus major</i>) |
| Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>) |
| Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>) |
| Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) |
| Nocciolaia (<i>Nucifraga caryocatactes</i>) |
| Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>) |
| Corvo (<i>Corvus frugileus</i>) |
| Cornacchia nera (<i>Corvus corone corone</i>) |
| Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) |
| Corvo imperiale (<i>Corvus corax</i>) |
| Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) |
| Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>) |
| Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>) |
| Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>) |
| Venturone (<i>Serinus citrinella</i>) |
| Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>) |
| Lucarino (<i>Carduelis spinus</i>) |
| Organetto (<i>Carduelis flammea</i>) |
| Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>) |
| Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) |
| Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>) |
| Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) |